3 2044 107 267 783

Tax
P69



Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/plantarumindigen2177unse

PLANTARUM
indigenarum et exoticarum
ICONES
ad vivum coloratae
oder
Sammlung
nach der Natur gemalter
Abbildungen
inn-und ausländischer Pflanzen,
für Liebhaber und Beflissene der Botanik.

Herausgegeben
von
einer Gesellschaft Kräuterkenner.



Zweiter Jahrgang.

Wien und Leipzig,
bei Lukas Hochenleitter und Kompagnie.
MDCCLXXXIX.

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

32024
July 30, 1919



ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

Erinnerung.

Von dieser Sammlung nach der Natur gemalter inn- und ausländischer Pflanzen für Liebhaber und Beflissene der Botanik erscheinen alle zween Monate zehn Platten, welche so wie jedes der vorhergehenden Hefte von nun an für 1 fl. 15 kr. oder 20 Gr. ausgegeben werden. Da der Preis so äusserst wohlfeil angesetzt ist; so wird man von selbst einsehen, daß bei diesem Unternehmen nicht Gewinnsucht, sondern die Verbreitung der Pflanzenkenntniß durch eine wohlfeile Mittheilung der in den großen und theuern botanischen Werken, die sich nicht jeder anschaffen kann, befindlichen, nach der Natur ausgemalten Pflanzen, die Absicht ist.

Und da die Pflanzen, welche wir in gegenwärtigem Format auf das saubersie gestochen und illuminirt liefern, ohnehin in der neuesten Murrayschen Ausgabe des Linneischen Pflanzenreichs, so in jedermanns Händen ist, befindlich sind; so enthalten wir uns aller unnöthigen Beschreibung, und fügen blos unter jede Pflanze die sistematische lateinische und deutsche Benennung bei, unter welcher man sie im Linneischen Sistem beschrieben findet; diejenigen, welche in diesem Sistem noch nicht vorkommen, werden wir mit einem Sternchen bezeichnen.

Sechs Zehende machen immer einen Jahrgang aus; und beim Schluße desselben wird ein Register über alle 6 Zehende ausgegeben, da denn die blauen Umschläge beim Einbinden weggeworfen werden können.

Die Herausgeber.

Wir, als Verleger dieses prächtigen Werks werden zur Verschönerung desselben das unsrige mit Vergnügen beitragen, auch die Fortsetzungen richtig liefern. Wir ersuchen aber sämmtliche Herren Buchhändler, ihre Freunde aufzumuntern, daß sie sich dieses äusserst nützliche Werk schon jezo beilegen, da es im Preise noch nicht zu hoch hinaufläuft, weil wir gesinnt sind, mit den versprochenen Fortsetzungen viele Jahre zuzuhalten, ja vielleicht gar auf den Gedanken fallen möchten, anstatt 6 Zehende jährlich, jeden Monat Eines, mithin zwölf im Jahre erscheinen zu lassen, auf welche Weise dann manchem Liebhaber der Ankauf des ganzen Werks auf einmal wegen des vielen Geldes erschweret werden dürfte, welcher Ungelegenheit ein jeder ausweichen kann, wenn unsere Bitte und unser gute Rath in Erfüllung gehen.

Zur größeren Zierde dieses Werks haben wir zu den ersten zween Jahrgängen ganz neue dem Gegenstande noch mehr anpassende Titeln verfertigen lassen, welche den Besitzern dieser zween Jahrgänge willkommen, und einige Groschen Nachschuß hiefür nicht ungelegen fallen werden. Die Titeln für die folgenden Jahrgänge hingegen sollen unentgeltlich folgen, ob sie gleich einen bedeutenden Aufwand erfordern, weil sie den vorigen an Pracht nicht nachstehen dürfen. Wenn schon das Werk an sich selbst in Vergleichung anderer von dieser Art einen sehr gemäßigten Preis hat, so wünschten wir dennoch denselben mildern zu können; allein es läßt sich wegen des immer steigenden Preises des Papiers, Kupfers ꝛc. ingleichen der Theure der Viktualien, wodurch Stich, Druck und Malen erhöhet werden, gegenwärtig nicht wohl thun, weil unser Gewinn ohnehin zur Zeit noch unbedeutend ist.

Wien im Hornung 1789.

Lukas Hochenleitter
und Komp.

Alphabetisches Verzeichniß

der

Abbildungen

inn- und ausländischer Pflanzen,

so in den 6 Heften

des

zweyten Jahrgangs

enthalten sind.

A.

Achillea atrata, **Geschwärzte Achillee.** 19. Klasse.

Mit Blättern, deren Fiederchen kammförmig und ganz sind, und weichharigen Fruchtstielen. Auf den schweizerischen vallesischen und österreichischen Alpen, an etwas feuchten rauhen Orten.

Aconitum Napellus. **Giftiger Eisenhut.** 13. Klasse.

Mit linienförmigen, oben breiteren, durch eine Linie ausgefurchten Einrissen der Blätter. In der Schweiz, Bayern, Frankreich, Deutschland.

Amaryllis Belladonna. **Schöne Amaryllis.** 6. Klasse.

Mit vielblüthiger Blumenscheide, glockenförmigen mit dem Nagel zurückgebogenen gleichen Blumenkronen, und niedergebogenen Zeugungsgliedern. Auf den Caribäischen Inseln, auf Barbados, Surinam.

Anchusa italica. **Italiänische Ochsenzunge.** 5. Klasse.

Mit lanzetartigen wellenförmigen Blättern, von welchen die obersten zugespitzt sind, und pinselförmigen Kelchschuppen. In Italien.

Anchusa tinctoria. **Färberochsenzunge.**

Filzicht, mit lanzetförmigen stumpfen Blättern. Die Staubgefäße kürzer als die Blumenkrone. In Montpellier, Schlesien.

Anemone pratensis. **Wiesen-Anemone, Küchenschelle.** 13. Klasse.

Mit eingehüllte Fruchtstiele, an der Spitze zurückgebogenen Blumenblättern, und 2mal gefiederten Blättern. In Europa auf verwilderten, trocknen Feldern und sonnichten etwas hohen Orten.

Angelica sylvestris. **Wilde Engelwurz.** 5. Klasse.

Mit gleichen, eyrund-lanzetförmigen, gesägten Blättern. Im kältern Europa in feuchten waldichten Gegenden.

Asclepias gigantea. **Große Aesculapie.** 5. Klasse.

Mit stengelumfassenden, länglicht-eyrunden unten harigen Blättern. In Aegypten.

C.

Centaurea centaurium. **Große Flockenblume.** 19. Klasse.

Mit wehrlosen Kelchen, eyrunden Schuppen, gefiederten Blättern, und gesägten ablaufenden Blättchen; Auf den garganischen Alpen, auf Baldo, in der Tatarey.

*) Chomelia spinosa. **Stachliche Chomelie.** 4. Klasse.

Diese schöne Pflanze fehlt noch im linneischen System. Man findet sie ausführlich beschrieben in Herrn von *Jacquins* Hist. plant. amer. Edit. pict. allwo sie auch Tab 17. abgebildet ist. Sie wächst in Carthagena.

Chrysophyllum cainito. **Gemeiner Sternapfel.** 5. Klasse.

Mit eyeunden parallel gestreiften Blättern, so unten filzicht-glänzend sind. In Martinik.

Cinchona caribæa. **Caribäische Fieberrinde.** 5. Klasse.

Mit vielblüthigen Fruchtstielen. Auf den Caribäischen Inseln.

*) Coccoloba diversifolia. **Seetraube mit verschiedenen Blättern.** 8 Klasse.

Diese Art fehlt noch in der Murrayschen Ausgabe des linneischen Pflanzensystems. Herr von *Jacquin* hat sie in Hist. plant. amer. Edit. pict. vollständig beschrieben und abgebildet. In Amerika.

Columnea scandens. **Kletternde Kolumnee.** 14. Klasse.

Mit sehr zottigen Blumenkronen. In den Wäldern auf Martinik.

Copaifera officinalis. **Offizineller Kopaibebalsambaum.** 10. Klasse.

Die einzige bekannte Art dieses Geschlechts. Die Blätter stehen wechselweis, sind gefiedert, 4 paarig, die Blättchen an der andern Seite sind schmäler und stehen wechselweis, mit Ausnahme der letztern. In Brasilien, auf den Antillischen Inseln.

Co-

Coriandrum sativum. **Gemeiner Coriander.** 5 Klasse.

Mit kuglichten Früchten. In Italien.

Crassula coccinea. **Scharlachrothes Dickblatt.** 5. Klasse.

Mit eyrunden flachen, knorplicht-gebrämten, an der Basis verwachsenen einschneidenden Blättern. Aethyopien.

Crataegus Aria. **Mehlbeerbaum.** 12. Klasse.

Mit eyrunden, eingeschnittenen, gesägten, auf der Unterfläche filzichten Blättern. Wird ein grosser Baum. In den kältern Gegenden von Europa, in der Schweiz, Schweden, England.

Curcuma longa. **Lange Gilbwurz.** 1. Klasse.

Mit lanzetförmigen Blättern, die sehr zahlreiche Seitenrippen haben. In Indien.

D.

Datura tatula. **Blauer Stechapfel.** 5. Klasse.

Mit dornichten, eyrunden, aufrechtstehenden Saamengehäusen, geherzten, fettglatten und gezähnten Blättern. In Amerika.

Delphinium consolida. **Feld-Ritterspurn.** 13. Klasse.

Mit einblättrigen Honigbehältnissen, und etwas getheiltem Stengel. In Europa, vorzüglich auf Brachäckern.

Dracocephalum canariense. **Canarischer Drachenkopf.** 14. Klasse.

Mit geöhrten Blumen, und zusammengesezten Blättern. Auf den Canarischen Inseln, in Amerika.

E.

Echites umbellata. **Geschirmter Klammerstrauch.** 5. Klasse.

Mit geschirmten Fruchtstielen, eyrunden, stumpfen, zackigen Blättern, und windbarem Stengel. In Jamaika.

Euphorbia paluſtris. **Sumpf-Euphorbie.** 11. Klasse.

Mit vielspaltigem Schirme, zweyspaltigen eyrunden Hüllchen, lanzetförmigen Blättern, und unfruchtbaren Zweigen. Im wärmern Schweden, Deutschland, Holland.

F.

Fritillaria corona imperialis. **Kaiser-Kronblume.** 6. Klasse.

Mit zopfichter, unten nakter Traube, und vollkommen ganzen Blättern. Persien ist ihr Vaterland. Sie kam von Konstantinopel nach Europa.

G.

Geranium moschatum. **Bisam-Storchschnabel.** 16. Klasse.

Mit vielblumigen Fruchtstielen, 5 männlichen Blumen, gefiederten, eingeschnittenen Blättern, und gefiedert in Queerstücke gespaltenen Keimblättchen (cotyledonibus.)

Glycirrhiza echinata. **Geigeltes Süßholz.** 17. Klasse.

Mit geigelten Hülsen, blattansätzigen Blättern und einem ungleich gepaarten aufsitzenden Blättchen. Zu Gargano in Apulien, in den Nagischen Wüsten der Tatarey.

H.

Hippocratea volubilis. **Windbare Hippokratee.** 3. Klasse.

Ist die einzige bekannte Art dieses Geschlechts. Der Kelch fünfmal getheilt. 5. Blumenblätter. 3. verkehrt-herzförmige Samenkapseln. Im wärmern Amerika.

I.

Ipomæa coccinea. **Scharlachrothe Trichterwinde.** 5. Klasse.

Mit geherzten zugespitzten, unten winklichten Blättern, und vielblüthigen Fruchtstielen. In Domingo.

M.

Myginda uragoga. **Harntreibende Myginde.** 4. Klasse.

Sie ist die einzige Art dieses nach dem verdienstvollen Hrn. Hofrath von Myginde so benannten Geschlechts. Der Kelch viermal getheilt. 4. Blumenblätter. Die Steinfrucht kuglicht. Im wärmern Amerika.

N.

Nerium Oleander. **Gemeiner Oleander.** 5. Klasse.

Mit gleichbreiten, lanzetförmigen, zu dreyen stehenden Blättern und gekrönten Blumenkronen. Sein Vaterland ist Gades in Ostindien, an etwas feuchten Orten.

O.

Onopordum acanthium. **Gemeine Zellblume.** 19. Klasse.

Mit sparrichten Kelchen, abstehenden Schuppen, und eyrundlänglichten, vertieften Blättern. Eine grau-grüne Pflanze, mit von dem Stengel bis zu dem Kelche gerade hinlaufenden Flügeln, einem Kelche mit abstehenden, pfriemenförmigen Schuppen. In Europa, auf gebauten Orten und Landwegen.

P.

Papaver somniferum. **Schlafmachender Mohn.** 13. Klasse.

Mit fettglatten Kelchen und Samenkapseln, und den Stengel umfassenden eingeschnittenen Blättern. Im wärmern Europa, an gebauten Orten, Landwegen.

Par-

Parkinsonia aculeata. **Stachliche Parkinsonie.** 10. Klasse.

Die einzige bisher bekannte Art dieses Geschlechts. Der Kelch fünfspaltig; 5. Blumenblätter, so eyrund, von welchen das unterste nierenförmig ist. Kein Griffel. Die Hülse halsbandförmig. Im wärmern Amerika.

Plumeria alba. **Weisse Plümerie.** 5. Klasse.

Mit lanzetförmigen, zurückgerollten Blättern, und oben knollichten Fruchtstielen. In Jamaika.

Portlandia hexandra. **Sechsmännliche Portlandie.** 5. Klasse.

Mit sechsmännlichen Blumen. In den Waldungen von Carthagena.

Portulaca patens. **Abstehender Portulak.** 11. Klasse.

Mit lanzetförmig-eyrunden, flachen Blättern, zweygichter Risse, und zweyblättrigen Kelchen. Die Samenkapsel dreyklappig. In Amerika.

Potentilla reptans. **Kriechende Potentille.** 12. Klasse.

Mit fünffachen Blättern, kriechendem Stengel, und einblumigen Fruchtstielen. In Europa auf thonichten etwas hohen sonnichten Orten.

Psychotria herbacea. **Krautartige Psychotrie.** 5. Klasse.

Mit krautartigem, kriechenden Stengel, und geherzten gestielten Blättern. In beyden Indien, in schattigen, feuchten Gegenden.

R.

Rhamnus colubrinus. **Schlangen-Wegdorn.** 5. Klasse.

Wehrlos, mit einweibichen, aufrechtstehenden Zwitterblumen, dreyknöpfichten Samenkapseln, und roßfärbigfilzichten Blattstielen. In Amerika.

Rhamnus cubensis. **Cubaischer Wegdorn.**

Wehrlos, mit Zwitterblumen, dreyfächerigen Kapseln, und runzlichten vollkommen ganzen filzichten Blättern. Auf der Insel Cuba an strauchigten Meerestränden.

Rheum rhabarbarum. **Gewöhnlicher Rhabarbar.** 9. Klasse.

Mit etwas weichhärigen Blättern, und gleichen Blattstielen. In China, Sibiren. Die wahre Rhabarbar kommt nicht von dieser Art, sondern von dem Rheo palmato.

Rosmarinus officinalis. **Offizineller Roßmarin.** 2. Klasse.

Die einzige bekannte Art dieses Geschlechts. Die Blumenkrone ungleich, mit oberer zweymal getheilter Lippe. Die Staubfäden lang, krumm, einfach und mit einem Zahn versehen. In Spanien, Italien, Schweiz, Morgenland, auf den französischen Gebirgen.

Rubia tinctorum. **Färber-Röthe.** 4. Klasse.

Mit jährigen Blättern, und stachlichtem Stengel. In Montpellier, Italien, Schweiz, und auf den Wiesen an der Donau.

Ru-

Rumex patientia. **Gedult-Ampfer.** 6. Klasse.

Mit Zwitterblumen, vollkommen ganzen Klappen, von welchen nur eine samentragend ist, und eyrundlanzetförmigen Blättern. In Meissen, Hessen, Deutschland.

Ruscus aculeatus. **Stachliger Mausdorn.** 22. Klasse.

Mit nakten auf der Oberfläche blumentragenden Blättern. In Frankreich, Italien, in der Schweiz ꝛc. in rauhen Haynen.

S.

Samyda nitida. **Glänzende Samyde.** 10. Klasse.

Mit achtmännichen Blumen, und geherzten, fettglatten Blättern. In Amerika.

Satyrium nigrum. **Schwarze Stendelwurz.** 20. Klasse.

Mit handförmigen Zwiebeln, gleichbreiten Blättern, und umgewandter, unzertheilter Lippe des Honigbehältnisses. Auf den lappländischen, schweizerischen Alpen.

Solanum dulcamara. **Bittersüßer Nachtschatten.** 5. Klasse.

Mit wehrlosem staudigem Stengel, obern spiesförmigen Blättern, und unächtdoldigen Trauben. In Europa an feuchten Zäunen und Hecken.

Spondias myrobalanus. **Myrobalanbaum.** 10. Klasse.

Mit länglichtrunden Blattstielen, und zugespitzten glänzenden Blättern. Im mittägigen Amerika.

Stapelia hirsuta. **Zottige Stapelie.** 5. Klasse.

Mit aufrecht stehenden Zähnchen der Zweige. Am Vorgebirge der guten Hofnung.

T.

Tabernæmontana citrifolia. **Zitronblättrige Tabernämontane.** 5. Klasse.

Mit gegen einanderstehenden eyrunden Blättern, und geknault-schirmförmigen Seitenblumen. Im warmen Amerika.

Taxus baccata. **Gebeerter Eibenbaum.** 22. Klasse.

Mit aneinander stehenden Blättern. In Europa, Canada.

Teucrium montanum. **Berg-Gamander.** 14. Klasse.

Mit einer Endkrone, und lanzetförmigen, vollkommen ganzen, auf der Unterfläche filzichten Blättern. An trocknen Orten in Deutschland, um Montpellier, Genf, in der Schweiz, um Paris.

Til-

Tillandsia lingulata. **Gezüngelte Tillandsie.** 6. Klasse.

Mit lanzetartig-gezüngelten, vollkommen ganzen, unten bauchigten Blättern; Im mittägigen Amerika, auf sehr alten Bäumen.

Trifolium arvense. **Acker-Klee.** 17. Klasse.

Mit weichharigen, eyrunden Aehren, und borstenförmigen, weichharigen Kelchzähnen. In Europa, in Nordamerika.

U.

Ulmus campestris. **Feld-Ulmbaum.** 5. Klasse.

Mit doppeltgesägten, und an der Grundfläche ungleichen Blättern. In Europa bey Dörfern.

V.

Varronia bullata. **Blasichte Varronie.** 5. Klasse.

Mit eyrunden, adrichten, runzlichten Blättern, und kuglichten Aehren. In Amerika.

Veronica virginica. **Virginischer Ehrenpreis.** 2. Klasse.

Mit Endähren; und vier oder fünffachen Blättern. In Virginien.

X.

Ximenia americana. **Amerikanische Ximenie.** 8. Klasse.

Mit länglichten Blättern, und vielblumigen Fruchtstielen. In Amerika.

Nachricht.

Die Liebhaber dieses Werks, so jeden Jahrgang gebunden haben wollen, können dieses Verzeichniß entweder vorn oder hinten an die Pflanzen anhängen lassen. Besser aber werden Sie thun, wenn Sie die Pflanzen nicht einbinden lassen, denn da können sie solche sammeln, bis sie mehrere Arten von einem Geschlechte erhalten, und sie leichter nach einem selbst beliebigen System ordnen. Mit der Zeit können sie auch dem Linneischen System beygebunden werden, weil man sich bestreben wird, nach und nach alle darinn befindliche Pflanzen zu liefern.

Hippocratea volubilis.
Windbare Hippokratee.

Ipomea coccinea.
Scharlachrothe Trichterwinde.

Potentilla reptans.
Kriechende Potentille.

Solanum dulcamara.
Bitterſüßer Nachtſchatten.

Veronica virginica.
Virginiſcher Ehrenpreis.

Anchusa italica.
Italiänische Ochsenzunge.

Anchusa tinctoria.
Färber = Ochſenzunge.

Portlandia hexandra.
Sechsmännige Portlandie.

Dracocephalum canariense.

Canarischer Drachenkopf.

Glycyrrhiza echinata.

Geigeltes Süßholz.

Fritillaria Corona imperialis.
Kaiſer = Kronblume

Teucrium montanum.

Berg=Jamander.

Onopordum acanthium.

Gemeine Zellblume.

Rubia tinctorum.
Färber=Röthe.

Copaifera officinalis
Offizineller Copaivebalsambaum.

Centaurea Centaurium.
Große Flockenblume.

Cinchona caribæa.
Caribäische Fieberrinde

Stapelia hirsuta.
Zottige Stapelie.

Tillandsia lingulata.
Gezüngelte Tillandsie.

Parkinsonia aculeata.
Stachlige Parkinsonie

Amaryllis belladōna.

Schöne Amaryllis.

Gratægus aria.
Mehlbeerbaum.

Blumeria alba.
Weisse Plümerie.

Rumex patientia.
Gedůld = Rmpfer.

Curcuma Longa.
Lange Gilbwürz.

Delphinium Consolida.
Feld = Ritterſporn.

Chrysophyllum cainito.

Gemeiner Stern-Apfel.

Coriandrum sativum.
Gemeiner Coriander.

Varronia bullata.

Blaſichte Warronie.

Coccoloba diversifolia
Seetraube mit verschiednen Blättern.

Datura tatula.
blauer Stechapfel.

Ulmus campestris.
Feld – Ulbaum.

Ximenia americana.
Amerikanische Ximenie.

Nerium oleander.
Gemeiner Oleander.

Trifolium arvense.
Akkerklee.

Crassula coccinea.
Scharlachrothes dickblatt.

Aconitum Napellus.
Giftiger Eisenhut.

Spondias myrobalanus?
Myrobalanbaum.

Angelica sylvestris.
Wilde Engelwürz.

Chomelia spinosa.
Stachlige Chomeli.

Rheum rhabarbarum.
gewöhnlicher Rhabarbar.

Asclepias gigantea.
Große Aesculapie.

Papaver somniferum
Schlafmachender Mohn

Geranium moschatum

Bisamstorchschnabel

Myginda uragoga.
Harntreibende Mÿginde

Rhamnus cubensis.
Cubaischer Weegdorn.

Achillea atrata.
Geschwärzte Achillee.

Anemone pratensis.
Wiesen = Anemone.

Tabernæmontana citrifolia.
Citronblällrige Tabernämontane.

Rosmarinus officinalis.
Offizineller Rosmarin.

Taxus baccata.
Gebeerter Eibenbaum.

Rhamnus colubrinus.
Schlangen Wegdorn.

Columnea scandens.

Kletternde Columnee.

Echites umbellata.

Doldenförmiger Klammerstrauch.

Psychotria herbacea.
Krautartige Psychotrie.

Portulaca patens

Abstehender Portulak

Satyrium nigrum.
Schwarze Stendelwurz.

Euphorbia palustris.

Sümpf = Euphorbie

Ruscus aculeatus.
Stachliger Mausdorn.

Samyda nitida.
Glänzende Samyde.